



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL TABACCO VIRGINIA BRIGHT

A cura del
Comitato Tecnico Scientifico per il Tabacco
(Coordinatori prof. G. COVARELLI e F. VENTURA)

Aggiornamento maggio 2019

Realizzato in collaborazione con



Introduzione

Possiamo parlare di un Disciplinare di produzione come di uno strumento che nel tracciare le linee guida per il miglioramento qualitativo definisce altresì le Norme di una produzione che sia Socialmente Responsabile.

Una estensione quindi, del concetto di miglioramento qualitativo ai temi che riguardano la sostenibilità ambientale, il rispetto della salute degli operatori e del consumatore finale. Il rispetto del consumatore finale si lega ad una tematica, definita “integrità del prodotto”, che oggi appare fondamentale e alla quale deve essere dedicata la massima attenzione.

Questo Disciplinare di Produzione si configura quindi, come strumento operativo volto ad evitare sia errate pratiche colturali sia una non corretta manipolazione del prodotto da parte del coltivatore che potrebbero rendere potenzialmente meno apprezzabile il tabacco stesso.

Punti cardine del Disciplinare sono:

- ◆ La **responsabilità sociale**: l'assicurazione della conformità alle norme sulla sicurezza sul lavoro, sui rapporti contrattuali con particolare riferimento al lavoro minorile e del miglioramento delle pratiche finalizzato al rispetto ambientale e alla sicurezza del consumatore
- ◆ La **scelta varietale**: è un punto molto importante che condiziona poi l'impostazione di tutte le successive scelte tecniche colturali. Criteri base da seguire: resistenza o tolleranza ad avversità biotiche ed abiotiche, performance in funzione delle diverse condizioni pedoclimatiche, qualità merceologica richiesta dal mercato.
- ◆ L'**uso esclusivo di sementi certificate**: indispensabile GMO free e seme proveniente da piante madri basse convertitrici (LC) della Nicotina.
- ◆ La **definizione di buone pratiche colturali compresa una corretta lotta antiparassitaria**: buone pratiche colturali sono tutte quelle economicamente attuabili, sicure per gli operatori e rivolte a produrre qualità. Esse tengono conto della sostenibilità ambientale e quindi sono volte a proteggere le risorse idriche, il suolo, l'aria e la vita di piante ed animali. Avvicendamenti colturali, reintegrazione della

sostanza organica con colture intercalari, corretta gestione del suolo con le sistemazioni idraulico agrarie e le lavorazioni, giuste dosi di concimazione, lotta integrata, utilizzo di agrofarmaci registrati sulla coltura, di bassa classe tossicologica; rispetto dei tempi di carenza prima della raccolta, dei Limiti Massimi di Residui previsti per legge, e via di seguito.

- ◆ **L'allestimento del prodotto:** la giusta umidità e densità del tabacco all'interno dei colli è condizione indispensabile per una corretta conservazione e per ridurre la formazione di Nitrosammine. L'attenzione all'eliminazione di sostanze estranee che possono contaminare il tabacco è priorità assoluta e alla base del concetto di integrità del prodotto.
- ◆ **Il monitoraggio dei punti critici del processo produttivo e del rispetto delle norme e la tracciabilità del prodotto:** attraverso l'assistenza Tecnica prestata dalle Associazioni, che avranno il compito di monitorare e registrare la tecnica adottata dal Coltivatore e assicurare l'identificazione del prodotto, sarà possibile garantire l'origine e i modi in cui è stato coltivato il tabacco e rendere visibile l'affidabilità di tutto il processo produttivo.

Esigenze pedologiche

Il terreno può influenzare la resa e la qualità del tabacco in funzione delle sue caratteristiche chimiche e fisiche. Per quanto riguarda le prime è necessario porre in evidenza che un elevato contenuto di azoto e di sostanza organica non consente di ottenere un tabacco Virginia di elevata qualità.

Un contenuto di sostanza organica superiore al 2,5% sconsiglia la coltivazione di questa tipologia di tabacco.

Per la coltivazione di questa specie è da scartare qualsiasi terreno che contenga cloruri che deprimono fortemente la combustibilità del tabacco.

Questa coltura preferisce un pH di 5,5-6,0.

Qualunque sia la tessitura è necessario che nel terreno non vi siano ristagni d'acqua. La coltura del tabacco Virginia Bright preferisce terreni tendenzialmente sabbiosi, ma si adatta bene anche in quelli tendenzialmente argillosi purché dotati di buona struttura e di drenaggio delle acque.

Esigenze climatiche

Tra i fattori climatici in grado di condizionare quantitativamente e qualitativamente la coltura hanno importanza preminente la temperatura dell'aria e del terreno, la disponibilità di acqua nel terreno, l'umidità relativa dell'aria, la durata e l'intensità dell'illuminazione.

Il tabacco inizia a vegetare quando la temperatura del terreno è intorno a 10-13°C. Dato che un terreno bagnato si riscalda meno rapidamente di uno asciutto, i campi devono essere ben sistemati per facilitare lo sgrondo dell'acqua in eccesso.

Temperature diurne di 25-30°C e notturne di 16-20°C sono ottimali per l'accrescimento del tabacco Virginia.

Aree di produzione e rese

Al fine di garantire che i fattori pedo-climatici siano favorevoli alla coltivazione e quindi assicurare una discreta qualità di base, per il Virginia Bright il pieno rispetto delle norme contenute nel presente Disciplinare di Produzione consentono produzioni che per le quantità pur differendo molto in funzione dell'area di produzione, si attestano mediamente intorno a 3,6 t ha⁻¹. Oltre tali rese, in aree non particolarmente vocate, si può incorrere in uno scadimento dell'insieme delle caratteristiche di qualità, definite nel Programma per il Miglioramento Qualitativo, oggetto e scopo del presente Disciplinare.

Avvicendamento colturale

La migliore precessione colturale per il tabacco Virginia è un cereale a ciclo autunno-vernino quale frumento o orzo o un'oleaginosa quale colza o girasole che consentono le lavorazioni del terreno in epoca tale da permettere la formazione di una buona struttura e una buona gestione delle piante infestanti. Al contrario, il mais non è da considerare come buona precessione colturale.

È fortemente sconsigliato ripetere per più di due anni consecutivi la coltura o un'altra solanacea nello stesso terreno. Dove esiste disponibilità di terreni buona pratica è di coltivare tabacco sullo stesso appezzamento ad intervalli di almeno tre anni.

Gestione del suolo

È opportuno prestare maggiore attenzione a tutte quelle pratiche colturali che

agiscono positivamente sulla fertilità e sulla struttura del terreno; quest'ultima, infatti, ha un'influenza determinante sulla qualità del tessuto fogliare.

Sistemazioni idraulico-Agrarie

Le sistemazioni idraulico-Agrarie hanno lo scopo di evitare ristagni d'acqua favorendo:

- minore suscettibilità della coltura alle fitopatie (es: marciume radicale da *Chalara elegans* Nag Raj and Kendrick) e conseguente diminuzione dell'uso di prodotti chimici;
- minor sviluppo di particolari piante infestanti e parassite;
- più rapido e uniforme insediamento della coltura per una maggiore contemporaneità delle fasi di sviluppo e quindi l'ottimizzazione di tutti gli interventi colturali;
- tempestività degli interventi colturali e in particolare del trapianto e della raccolta meccanica.

Lavorazioni

Subito dopo la raccolta della coltura precedente, si deve eseguire l'aratura del terreno ad una profondità variabile in funzione della sua tessitura: 35-45 cm nei terreni prevalentemente argillosi, e 35-40 in quelli di medio impasto o franchi. I terreni prevalentemente sabbiosi possono essere arati a fine inverno inizio primavera alla profondità di 25-30 cm. Essendo importante anticipare l'epoca di trapianto, con le lavorazioni si dovrà favorire, oltre al deflusso dell'acqua, un'anticipata preparazione del letto di trapianto.

Nei terreni di medio impasto o tendenzialmente argillosi è consigliabile eseguire una lavorazione a doppio strato (ripuntatura più aratura superficiale) o un'aratura tradizionale prima dell'inverno, entrambe seguite da un'estirpatura e una o due erpicature con erpice rotante per un'ottimale preparazione del letto di trapianto.

Nei terreni tendenzialmente sabbiosi si dovrà eseguire un'aratura invernale o anche in prossimità dell'epoca di trapianto, seguite da un'estirpatura ed un'erpicatura con erpice rotante per la preparazione del letto di trapianto e sistemazione del terreno a porche.

Ulteriori interventi possono essere:

- una *rippatura profonda* al fine di rompere la suola di lavorazione, avere un più rapido

- sgrondo dell'acqua e di conseguenza favorire l'aumento della temperatura del terreno;
- una *ripuntatura* nei terreni tendenzialmente argillosi nell'estate o nell'autunno precedente la coltura del tabacco per favorire la rottura della suola di lavorazione e uno sgrondo più rapido delle acque;
 - un'*assolcatura* con la funzione di offrire all'azione degli agenti atmosferici una maggiore superficie esposta, a tutto vantaggio dell'aumento della temperatura del terreno e miglioramento della sua struttura.

Lavori consecutivi

Circa dieci giorni dopo il trapianto è consigliabile eseguire nell'interfila della coltura una sarchiatura con attrezzo ad elementi discissori ("tiller" o similari), per diminuire la compattazione del terreno, favorirne l'arieggiamento e l'innalzamento della temperatura. Questo passaggio risulta altresì utile all'eliminazione di malerbe sfuggite al diserbo chimico. A questo intervento può essere abbinata una concimazione azotata.

È molto utile eseguire la rincalzatura, talvolta preceduta da una sarchiatura, allo scopo di favorire un miglior ancoraggio delle piante al terreno per aumentarne la resistenza al vento ed all'azione della macchina raccogliatrice.

Scelta varietale

Per la scelta delle varietà si dovrà fare riferimento a quelle iscritte o in corso d'iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà e a quelle di provenienza estera purché certificate, per le caratteristiche richieste, nei loro Paesi.

Nella scelta della semente, particolare attenzione dovrà essere posta alla purezza varietale e alla sanità fitopatologica; inoltre, le varietà dovranno risultare certificate "non geneticamente modificate".

Indicazioni sulle caratteristiche specifiche delle varietà consigliate sono riportate nella tabella allegata (Tabella 1). Dovranno essere preferite le varietà ad alta qualità merceologica ed in particolare con elevate caratteristiche qualitative del fumo.

Particolare importanza ha la resistenza alle diverse fitopatie con l'obiettivo di ridurre o non eseguire i trattamenti di difesa. Vi sono, inoltre, virus molto temibili per la

tabacchicoltura quali il mosaico (TMV) ed il virus necrotico della patata (PVY). Per i terreni dove il tabacco è coltivato senza interruzione per diversi anni di seguito, si impone la scelta di una varietà resistente a tali virosi per non incorrere in elevate perdite produttive.

Allevamento della piantina

L'allevamento della piantina avviene in serra mediante la tecnica del *float-system* che consiste nella semina su contenitori alveolati forati in basso riempiti di idoneo substrato a base di torba bionda e bruna e galleggianti in una vasca contenente acqua con disciolti elementi nutritivi ed agrofarmaci.

La corretta gestione del *float-system* richiede di porre attenzione ad alcuni importanti aspetti:

Dimensionamento delle serre e delle vasche al fine di:

- garantire una adeguata produzione di piantine per soddisfare le esigenze aziendali;
- evitare che nelle vasche ci sia spazio non occupato dai plateau;
- garantire il controllo climatico (temperatura e umidità relativa) della serra;
- automatizzare le operazioni di sfalcio;

È preferibile inoltre utilizzare acqua proveniente da pozzi ed eseguirne un'analisi preventiva.

Materiali da utilizzare

Contenitori alveolati da 170 a 260 fori. È indispensabile evitare di costipare eccessivamente il terriccio negli alveoli per non favorire lo sviluppo di radici spiralate.

È auspicabile utilizzare seme confettato. Dovrà essere assicurata la tracciabilità del lotto di seme utilizzato.

Non è consigliabile il riutilizzo dei plateau per produzioni successive. Le serre devono essere coperte con film plastici in polipropilene o polietilene più rete ombreggiante che servirà a limitare gli effetti negativi della luce.

È importante assicurare il corretto smaltimento e se possibile il riciclaggio dei materiali utilizzati per la produzione della piantina.

Elementi nutritivi da aggiungere all'acqua nella vasca

Nella scelta dei concimi va assolutamente ricercata una equilibrata presenza di N, P e K; al momento del riempimento della vasca immettere nella soluzione circa 150 g/m³ sia di azoto che di potassio e 75 g/m³ di fosforo (per esempio volendo usare un concime ternario 20-10-20, se ne dovrà impiegare circa 750 g/m³).

Al “rabbocco” della vasca, se necessario e volendo utilizzare nitrato di calcio (15,5% di N), se ne dovrà impiegare la dose di 300 g/m³ di acqua più eventuali integrazioni successive; oppure nitrato ammonico (26.5% di N) alla dose di 300-400 g/m³ di acqua con un unico intervento; la dose di questa concimazione aggiuntiva varia in funzione dello stadio vegetativo del tabacco.

È indispensabile controllare la conducibilità elettrica dell'acqua utilizzata; la conducibilità della soluzione finale non deve superare i 2500 µS.

Difesa dai parassiti animali e vegetali

La lotta antiparassitaria nei semenzai viene eseguita con trattamenti sovrachioma.

È necessario distribuire periodicamente esche insetticide lungo i bordi delle serre per evitare attacchi di lumache. Dalla fase di “crocetta” in poi, a seconda delle necessità, trattare le piantine con una miscela di prodotti con effetto insetticida e fungicida; particolare attenzione deve essere rivolta alla difesa dalla peronospora (*Peronospora tabacina* Adam), al fine di evitare il trapianto di materiale non sano che può essere causa delle relative fitopatie in pieno campo. I trattamenti non devono essere eseguiti nelle ore più calde della giornata. Prima del prelievo delle piantine per il trapianto, occorre eseguire l'ultimo trattamento di difesa da insetti e crittogame, evitando così nei successivi 10-12 giorni ulteriori trattamenti in pieno campo. Al termine del trapianto è indispensabile distruggere prontamente le piantine non utilizzate.

Per la scelta dei prodotti si vedano le tabelle allegate.

Operazioni di sfalcio

- eseguire il primo intervento quando le foglie delle piantine più sviluppate hanno raggiunto una lunghezza di circa 4 cm;
- regolare la macchina per asportare circa un terzo della lunghezza della foglia;

- gli interventi successivi devono essere eseguiti in funzione della crescita delle piantine;
- ogni volta che si passa da una vasca all'altra lavare la parte meccanica (elica e raccoglitore) del tosaerba con soluzione al 2% di fosfato trisodico o in alternativa con una soluzione di sali quaternari di ammonio e risciacquare accuratamente.

Controllo delle condizioni climatiche all'interno della serra

- arieggiare la serra tutti i giorni per favorire il ricambio dell'aria ed evitare quindi un eccessivo aumento di umidità relativa;
- nella fase di germinazione dei semi evitare correnti di aria;
- evitare che la temperatura superi i 30°C o scenda sotto 0°C;
- eliminare eventuali malerbe presenti che possono favorire attacchi di mosaico;
- nel periodo che precede il trapianto, se le condizioni climatiche lo consentono, lasciare aperta la serra anche durante la notte per favorire l'adattamento delle piantine alle condizioni esterne e limitarne lo sviluppo.

Dove l'allevamento della piantina in *float-system* avviene ad opera di vivai specializzati, questi dovranno essere preventivamente autorizzati e in grado di garantire la corrispondenza tra la semente scelta e la piantina prodotta.

Concimazione organica

La concimazione organica si può eseguire mediante sovescio, letamazione e interrimento dei residui colturali:

Sovescio

Si utilizzano prevalentemente leguminose come colture intercalari da seminare in settembre-ottobre.

Le specie più indicate sono favino (*Vicia faba* var. *minor*), trifoglio alessandrino (*Trifolium alexandrinum*), trifoglio incarnato (*T. incarnatum*) e trifoglio squaroso (*T. squarrosum*). Quest'ultimo è particolarmente indicato anche per il controllo dell'orobanche favorendone la germinazione e riducendo l'infestazione potenziale. Va tenuto in particolare considerazione che l'apporto di azoto dovuto al sovescio della parte epigea di queste leguminose può variare da circa 30 a 150 Kg/ha in funzione

dell'epoca di interrimento e dello sviluppo raggiunto dalla coltura.

Nel caso del favino la quantità di azoto lasciata per la coltura successiva può essere nettamente superiore.

Letamazione

Nell'eventuale letamazione occorre porre particolare attenzione alla scelta del letame da distribuire per quanto riguarda origine e stato di maturazione.

Bisogna evitare, per l'elevato contenuto di cloruri, l'utilizzazione di liquami e pollina.

Interramento dei residui colturali

Dopo la raccolta della coltura precedente, diversa dal tabacco, i residui colturali devono essere trinciati ed interrati con una lavorazione.

Nel caso di paglie di cereali, prima dell'interramento, è opportuno distribuire un chilogrammo di azoto per ogni quintale di paglia interrata; ciò facilita l'azione di decomposizione del materiale vegetale ad opera dei microrganismi.

Concimazione minerale

Lo scopo della concimazione è quello di garantire il mantenimento della fertilità e nel contempo favorire un incremento produttivo e soprattutto una elevata qualità del prodotto. Prima di eseguire il piano di concimazione si consiglia di effettuare una analisi chimico-fisica del terreno per ciascuna area omogenea di gestione dell'azienda, intendendosi con quest'ultima la porzione di superficie aziendale caratterizzata da suoli e pratiche agronomiche uniformi.

Nell'effettuare le analisi si dovranno adottare i metodi analitici indicati nei "Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo", pubblicati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo (S.I.S.S.).

Le caratteristiche del terreno da conoscere sono:

tessitura; pH; sostanza organica; azoto totale; fosforo assimilabile; potassio scambiabile; calcare totale; calcare attivo; cloruri.

Concimazione azotata

La concimazione azotata è uno degli aspetti più delicati ed importanti di tutta la tecnica colturale del tabacco, poiché se da un lato l'azoto aumenta la resa della coltura e la qualità del tessuto fogliare ("grana", elasticità, colore), dall'altro può peggiorarne la qualità merceologica fino a rendere non commerciabile il prodotto. L'azoto, inoltre, influenza la durata del ciclo vegetativo, la resistenza alle malattie, il contenuto in nicotina e nornicotina, gli zuccheri, la cura ed in sintesi tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del prodotto finale.

È importante tenere presente che:

- *la carenza di azoto* causa: colore pallido, tessuto liscio, riduzione dello sviluppo e della resa e non permette l'ottenimento di prodotto aromatico;
- *l'eccesso di azoto* causa: ritardo di maturazione, aumento della suscettibilità agli attacchi di crittogame ed insetti, eccessivo sviluppo dei germogli, difficoltà di cura dovuta a ritardo o assenza di maturazione con un allungamento della fase di ingiallimento e ampie bruciature nelle foglie; dal punto di vista ambientale l'aspetto negativo delle possibili perdite per lisciviazione.

Il quantitativo di azoto da somministrare varia in funzione di:

- linea varietale coltivata;
- investimento unitario;
- altezza di cimatura;
- coltura precedente e sua concimazione;
- andamento climatico;
- tessitura e contenuto di sostanza organica del terreno.

Per quanto riguarda il contenuto di sostanza organica nel terreno la S.I.S.S. propone la seguente classifica:

- Terreno povero: tenore di sostanza organica: < 1,5%;
- Terreno sufficientemente dotato: tenore di sostanza organica: 1,6-2,5%;
- Terreno ben dotato: tenore di sostanza organica: 2,6-3,5%;
- Terreno ricco: tenore di sostanza organica: > 3,5%.

Diverso dovrà essere l'apporto di azoto in queste differenti condizioni.

Particolare attenzione si dovrà porre nel determinare la dose e l'eventuale frazionamento della concimazione azotata al fine di ottimizzarne l'assorbimento da parte della pianta e quindi l'efficacia.

L'andamento stagionale ed in particolare la piovosità della zona, incidono sul quantitativo di azoto da somministrare in quanto scarse precipitazioni nel corso della coltura precedente o durante l'inverno che precede il periodo del trapianto, possono non avere dilavato l'azoto minerale somministrato in precedenza, quindi nel terreno ce ne sarà una maggiore disponibilità. Viceversa, un'accentuata piovosità nell'anno precedente o un andamento stagionale molto piovoso alla vigilia della coltura non consentono a questa di poter usufruire di una fertilità azotata residua. Per quanto riguarda l'azoto disponibile dalla mineralizzazione dei residui della coltura precedente, va ricordato che questo non sempre è positivo.

Si riportano i valori dell'azoto lasciato nel terreno da alcune colture che possono precedere il tabacco negli avvicendamenti:

Coltura praticata nell'anno precedente	N da residui (kg/ha)
Barbabietola	30/50
Cereali autunno-vernini - paglia asportata	-10
Girasole	0
Mais - stocchi asportati	-10/-20
Pomodoro, altre orticole	30/50
Erba medica	60/80
Sovescio di leguminose (in primavera)	50/150

In relazione alla scelta dei concimi da utilizzare si ricorda che la pianta di tabacco assorbe l'azoto sia sotto forma nitrica che ammoniacale, tuttavia nella scelta dei concimi azotati è consigliabile optare per quelli sotto forma nitrica.

Per quanto riguarda l'epoca di somministrazione, questo elemento deve essere fornito al momento della massima necessità per la coltura, che generalmente inizia 15-20 giorni

dopo il trapianto. La distribuzione deve avvenire preferibilmente lungo la fila della coltura.

Apporti successivi si eseguono in particolari situazioni di palese carenza da parte delle piante. Nei terreni tendenzialmente sabbiosi, al fine di evitare fenomeni di lisciviazione, è preferibile eseguire la concimazione in copertura, frazionata in più interventi. In ogni caso, la distribuzione dell'azoto non deve essere effettuata oltre lo stadio dell'ottava-decima foglia e comunque non oltre un mese dal trapianto.

Le dosi di azoto da apportare variano in funzione degli aspetti sopra indicati, tuttavia indicazioni razionali possono essere quelle di 0÷50 kg ha⁻¹ nei terreni tendenzialmente argillosi e di 80÷130 kg ha⁻¹ nei terreni tendenzialmente sabbiosi: i valori più bassi vanno considerati nel caso di terreni sufficientemente dotati di azoto o nel caso in cui il tabacco sia stato preceduto da un sovescio di leguminose o da una coltura che ha ricevuto un elevato quantitativo di azoto; i valori più alti sono da considerare nel caso di terreni poveri di sostanza organica, quando la coltura precedente ha depauperato il terreno in azoto e l'andamento stagionale sia stato caratterizzato da elevata piovosità nel corso della coltura precedente o durante l'inverno che precede il periodo del trapianto.

Concimazione fosfatica

Un giusto quantitativo di fosforo favorisce la precocità della coltura e uno sviluppo armonico della stessa. Un eccesso di questo elemento (superiore a 200-250 kg/ha) può ridurre leggermente la produzione, causare un eccessivo ispessimento delle foglie ed aumentare la nicotina. Viceversa, la carenza di fosforo ritarda la maturazione e le foglie tendono a crescere orizzontali e più strette del normale.

Il quantitativo totale di fosforo da apportare è strettamente legato al contenuto esistente nel terreno che, generalmente, nei terreni italiani non è elevato.

La soglia di sufficienza, secondo la S.I.S.S., determinata con il metodo Olsen, è compresa tra 30 e 60 ppm di P₂O₅ in relazione al valore della Capacità di Scambio Cationico (CSC) del terreno.

Una classificazione della dotazione in fosforo di un terreno è riportata nella tabella seguente:

P ₂ O ₅ totale (ppm)	P assimilabile (ppm)	Dotazione
0-6	0-2.6	Molto bassa
6.1-15	2.7-6.5	Bassa
15.1-23	6.6-10.0	Media
23.1-50	10.1-21.8	Alta
> 50	> 21.8	Molto alta

Quando la coltura si attua su terreni con dotazione molto bassa, bassa o media, è consigliabile un apporto di 100-150 kg/ha di P₂O₅, mentre se la dotazione è alta o molto alta la dose può allora essere di 40-70 kg/ha. Il fosforo, fortemente trattenuto dal potere assorbente del terreno, deve essere interrato; tutto o in parte potrà essere localizzato al trapianto vicino alla piantina.

Concimazione potassica

Il potassio è un elemento essenziale per la qualità del tabacco ed è il principale costituente delle ceneri. Un giusto apporto di questo elemento migliora l'attitudine alla cura, la combustibilità del tabacco, il colore, il peso specifico, nonché la struttura delle foglie e le loro proprietà igroscopiche. Inoltre, è riconosciuto al potassio il conferimento alla pianta di una maggiore resistenza a stress biotici e abiotici.

Una classifica della dotazione di potassio scambiabile (metodo internazionale) del terreno è riportata nella tabella seguente:

K ₂ O totale (ppm)	K scambiabile (ppm)	K (%CSC)	Dotazione
61-120	51-100	<2% CSC	Bassa
121-180	101-150	2-5% CSC	Media
181-240	151-200	>5% CSC	Alta

I concimi potassici devono provenire da solfati e non da cloruri e devono essere interrati

in quanto il potassio è trattenuto dal potere assorbente del terreno. Vanno interrati all'aratura nei terreni tendenzialmente argillosi e al momento della preparazione del letto di trapianto in quelli tendenzialmente sabbiosi.

I quantitativi da apportare variano in funzione della dotazione del terreno: se la dotazione è bassa il quantitativo da apportare dovrà essere di 200-250 kg/ha di K_2O ; se è media possono essere sufficienti 150-180 kg/ha di K_2O , mentre se alta, 100-130 kg/ha.

Trapianto

L'epoca del trapianto è strettamente influenzata dall'andamento stagionale primaverile e dalla tessitura del terreno. Si consiglia di iniziare le operazioni di trapianto quanto prima possibile, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche, al fine di favorire un anticipo di tutte le fasi del ciclo vegetativo. In funzione delle temperature, nei diversi areali di coltivazione, il trapianto inizia generalmente nella terza decade di aprile per concludersi alla fine di maggio. È consuetudine che i trapianti più precoci si avranno nei terreni tendenzialmente sabbiosi, quelli più tardivi nei terreni tendenzialmente argillosi.

Si deve tener presente che per uno sviluppo iniziale della pianta è necessaria una temperatura del terreno di 10-12°C.

La densità consigliata può variare da 22.000 a 26.000 piante ha^{-1} , in funzione dell'ottenimento di tabacco aromatico o da riempimento.

La distanza tra le file può variare tra 110 e 120 cm in base alle caratteristiche della macchina utilizzata per la raccolta.

Controllo delle piante infestanti

Dovranno essere privilegiati i metodi indiretti preventivi per la riduzione della flora infestante quali:

- avvicendamento colturale;
- interventi con specifiche lavorazioni complementari atte a preparare un letto di trapianto senza erbe infestanti;
- controllo delle piante infestanti nelle scoline e nelle aree perimetrali degli appezzamenti, al fine di evitarne la loro diffusione all'interno degli appezzamenti stessi;

- identificare in anticipo le erbe infestanti la coltura.

Diserbo chimico

È opportuno un impiego razionale del diserbo chimico al fine di limitare i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla coltura.

A tale proposito si ricorda di:

- impiegare principi attivi ad azione residuale in pre-trapianto alle dosi minime consigliate;
- per migliorare il controllo delle piante infestanti lungo la fila della coltura è possibile eseguire trattamenti localizzati con principi attivi di post-trapianto;
- incentivare la tecnica del trattamento localizzato sulla fila, controllando le infestanti tra le file del tabacco mediante i lavori consecutivi;
- nel caso di presenza di piante infestanti, in particolare perennanti, è opportuno eseguire, in assenza della coltura, trattamenti con diserbanti totali;
- impiegare nei diversi anni principi attivi con diverso meccanismo d'azione al fine di evitare il rischio della comparsa di fenomeni di resistenza delle infestanti agli erbicidi; fenomeno maggiormente possibile nei casi di monosuccessione del tabacco.

Il diserbo chimico può essere completato dalla sarchiatura o fresatura nell'interfila, abbinata all'eventuale ricalzatura della fila.

Per la scelta dei prodotti si vedano le tabelle allegate.

Irrigazione

La coltura del tabacco deve essere attuata mediante l'ausilio dell'irrigazione.

La carenza d'acqua durante il ciclo colturale causa un forte abbassamento produttivo e un peggioramento qualitativo. Stress idrici provocano al tabacco la chiusura degli stomi e di conseguenza, foglie dal tessuto a grana chiusa.

L'acqua utilizzata per l'irrigazione non deve apportare cloruri alla coltura. È generalmente ammesso che la soglia di pericolosità nell'acqua è di 30 ppm di cloro, ma dipende molto anche dai volumi totali distribuiti con l'irrigazione.

Tra i diversi metodi irrigui l'aspersione rappresenta quello maggiormente utilizzato.

Tra le tecniche alternative vi sono l'irrigazione a goccia e quella a basso volume.

Quest'ultima si è dimostrata molto efficiente palesando altresì caratteristiche positive

riguardo al risparmio idrico.

I volumi massimi di adacquamento per singolo intervento di irrigazione variano da 200 m³ ha⁻¹ in terreni tendenzialmente sabbiosi e con la coltura ad uno stadio intermedio di sviluppo, fino a 500 m³ ha⁻¹ in un terreno tendenzialmente argilloso e con la coltura molto sviluppata.

Il numero di adacquate varia oltre che con il volume di adacquamento, con la lunghezza della stagione irrigua e con l'andamento meteorologico.

Il turno irriguo, cioè l'intervallo di tempo in giorni che passa tra due successivi adacquamenti, è in funzione dell'acqua apportata con l'irrigazione, dalle piogge e di quella evapotraspirata dalla coltura. Poiché non tutta la pioggia che cade effettivamente concorre al reintegro di umidità del terreno, per convenzione si considerano utili quelle piogge che apportano più di 10 mm di acqua nelle 24 ore.

In base all'andamento stagionale, all'evapotraspirazione e alle caratteristiche fisiche del terreno, dopo, il trapianto è necessario distribuire volumi crescenti di acqua per ripristinare la capacità di campo.

In particolare, l'intervento irriguo successivo a quello effettuato al trapianto deve essere opportunamente ritardato al fine di favorire l'approfondimento delle radici delle giovani piante, consentendo così, nelle fasi successive del ciclo colturale, un buon ancoraggio e una maggior capacità di esplorare volumi maggiori di terreno, ottimizzando in tal modo l'utilizzo delle risorse idriche e nutritive. Si tenga tuttavia presente che l'esasperazione di questo concetto può causare prefioritura e mancato sviluppo della coltivazione.

In generale nei terreni sabbiosi si consiglia di ridurre i volumi di acqua e di aumentare la frequenza degli interventi.

Soprattutto nei periodi caratterizzati da una elevata evapotraspirazione, risulta importante eseguire un'irrigazione qualche giorno prima della raccolta al fine di avere in questa fase foglie con una buona turgidità, caratteristica importante per un'adeguata cura. È consigliabile, altresì, non raccogliere foglie quando la pianta ha ripreso a vegetare.

Cimatura

La cimatura va eseguita quando 2/3 delle piante presentano i bottoni fiorali.

Si esegue lasciando da 18 a 24 foglie utili (senza contare le prime 2-3 foglie basali che non vengono raccolte). In casi particolari caratterizzati da una elevata vigoria delle piante è consigliabile eseguire una cimatura relativamente alta anche al di sopra della 24^a foglia.

Controllo dei germogli

Dopo la cimatura, è necessario eseguire il controllo dei germogli che si originano dalle gemme situate all'ascella delle foglie e si sviluppano in conseguenza della rimozione della dominanza apicale. La presenza di germogli, infatti, determina riduzioni delle rese e peggioramento qualitativo dovuto alla bassa presenza nelle foglie di amido e di conseguenza di zuccheri riduttori. La presenza di germogli, inoltre, rende problematica la raccolta meccanica in quanto non selettiva tra questi e le foglie.

La tecnica per il controllo dei germogli si basa sull'impiego di fitoregolatori ad azione di contatto e ad azione sistemica da impiegare secondo diverse modalità:

Trattamenti frazionati in due interventi:

primo intervento: con prodotti ad azione di contatto, a base di alcol grassi, da impiegare diluiti in acqua, alla dose del 3% di formulato commerciale; normalmente necessitano dai 400-600 litri di acqua/ha. Il trattamento deve essere effettuato su piante asciutte, evitando giornate ventose e le ore più calde della giornata;

secondo intervento: da effettuarsi dopo 5-8 giorni, con prodotto ad azione sistemica, a base di idrazide maleica, da impiegare diluito in acqua a concentrazione non superiore al 3% per i formulati commerciali contenenti il 15% di p.a., o non superiori allo 0,8% per i formulati commerciali contenenti il 60% di p.a.; ciò utilizzando volumi di 400-500 litri/ha di acqua. Questa operazione si deve effettuare con il tabacco in pieno turgore vegetativo. Una pioggia entro le 6 ore dal trattamento può comprometterne l'efficacia.

Trattamenti frazionati in tre interventi:

Si utilizzano prodotti ad azione di contatto, a base di alcoli grassi, da impiegare in interventi successivi, a distanza di 5-7 giorni l'uno dall'altro e con soluzioni a

concentrazioni crescenti di formulato commerciale:

- 1-1.5% primo intervento;
- 2-2.5% secondo intervento;
- 3-3.5% terzo intervento.

Questa metodica può risultare sufficiente ad un buon controllo dei germogli nel caso di varietà precoci, mentre nel caso di varietà medio-tardive e tardive risulta necessario intervenire con un ultimo trattamento con un prodotto ad azione sistemica (idrazide maleica), alle dosi indicate in precedenza.

Per la scelta dei prodotti si vedano le tabelle allegate.

Prevenzione e difesa fitosanitaria in pieno campo

L'uso degli agrofarmaci deve essere limitato allo stretto necessario, facendo ricorso ad essi quando è indispensabile ed evitando, se possibile, qualsiasi difesa con trattamenti a calendario.

Per poter diminuire il loro impiego è necessario tenere nella massima considerazione i principi della lotta integrata che si basano su una serie di scelte tecniche che hanno come obiettivo non la semplice eliminazione dell'avversità ma un razionale compromesso tra esigenze tecnologiche, economiche ed ambientali.

Grande importanza devono avere le pratiche agronomiche preventive quali l'avvicendamento colturale, equilibrate concimazioni particolarmente azotate, uso di colture di copertura o di risanamento (es: trifoglio squaroso), lavorazioni a due strati, sarchiatura, oculata scelta delle soglie di intervento quali strumenti di base nella gestione integrata delle fitopatie. Le aziende di ridotte dimensioni fondiarie sono, talvolta, costrette a coltivare il tabacco per più anni consecutivi nello stesso appezzamento; in questi casi, terminata la raccolta, i residui colturali devono essere prontamente distrutti e se possibile allontanati. Si ricorda e si sottolinea il fatto che una corretta scelta delle linee varietali, che tenga conto delle diverse sensibilità alle fitopatie, rappresenta il punto di partenza per una razionale difesa fitosanitaria.

Per ogni situazione agroambientale è indispensabile determinare la soglia di presenza delle fitopatie al disotto della quale non necessita eseguire i trattamenti.

Prima del ricorso ai mezzi chimici si dovrà verificare:

- per le malattie fungine quando le condizioni climatiche diventano favorevoli per lo sviluppo del fungo (si consiglia di utilizzare i dati rilevati da stazioni meteorologiche ubicate nella zona di produzione), l'eventuale periodo di incubazione, la scelta del prodotto e i tempi utili di intervento: periodo di copertura nei riguardi della malattia e rispetto dell'intervallo di sicurezza prima della raccolta;
- per gli insetti la presenza (volendo per il monitoraggio possono essere utilizzate anche trappole a feromoni). Verificarne il ciclo biologico, le abitudini, i danni causati e la presenza di nemici naturali. Prima di decidere l'intervento, dovrà essere valutata la soglia del danno: il trattamento deve essere eseguito soltanto quando il costo sia inferiore alla perdita di prodotto.

Nell'eseguire i trattamenti, tra le diverse molecole idonee alla difesa della coltura la scelta dovrà essere fatta tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- agrofarmaci approvati e registrati per l'uso su tabacco;
- più basso intervallo di sicurezza;
- più bassa classe tossicologica;
- possibilità di essere abbinati a coadiuvanti specifici per poter ridurre la dose d'impiego;
- provata efficacia;
- serietà della Ditta produttrice;
- nel combattere una stessa avversità, nell'eventualità che si rendesse necessario, evitare di ripetere i trattamenti con lo stesso principio attivo.

Precisazioni importanti

- 1) Per i vari p.a. (principi attivi) esistono nel mercato più prodotti di differenti ditte e pertanto il **“prodotto commerciale di riferimento”** riportato nelle tabelle è a titolo **puramente indicativo**.
- 2) Verificare sempre lo stato dell'autorizzazione ministeriale al momento dell'acquisto e prima della sua applicazione per evitare di incorrere in sanzioni amministrative e/o penali. Le date riportate potrebbero subire variazioni in qualsiasi momento. Tenere in considerazione le date di scadenza delle autorizzazioni e dell'eventuale periodo di

smaltimento scorte prima di effettuare acquisti e/o nella gestione di eventuali rimanenze.

- 3) Durante il corso della stagione potrebbero essere concesse autorizzazioni per situazioni di emergenza fitosanitaria (art 53 Reg. 1107/2009). Per rimanere costantemente aggiornati si prega di consultare il sito del Ministero della Salute.

Nell'uso degli agrofarmaci è fondamentale il rispetto delle dosi e di tutte le altre istruzioni riportate in etichetta; durante la manipolazione e la distribuzione l'uso degli appropriati DPI previsti per legge in base alla classe tossicologica del prodotto.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai mezzi per la distribuzione degli agrofarmaci e al loro stato di manutenzione. Si valuta che un utilizzo nel corretto stato di efficienza permette di ridurre del 10-15% l'impiego di prodotto mantenendo inalterata l'efficacia del trattamento.

Si raccomanda particolare attenzione sia per la scelta del prodotto che per le modalità ed i tempi di distribuzione al fine di:

- garantire la massima sicurezza degli operatori;
- evitare residui sul tabacco o ridurli il più possibile e al massimo mai al di sopra dei limiti previsti dalla legge;
- evitare di alterare l'equilibrio biologico naturale e in particolare evitare danni agli insetti utili.

È assolutamente necessario che tutti i contenitori vuoti vengano puliti, forati per impedirne il successivo utilizzo e smaltiti nel rispetto delle normative vigenti.

Nel caso in cui si conservino gli agrofarmaci in azienda si ricorda di seguire le disposizioni di legge sul loro corretto stoccaggio.

Su un'apposita scheda è indispensabile annotare data, qualità e quantità degli agrofarmaci usati nella coltura.

L'elenco dei prodotti consigliati è riportato nelle tabelle allegate.

Fumigazione

Tra le avversità biotiche della coltura del tabacco, i nematodi soprattutto *Meloidogyne incognita* costituiscono una importante causa di decremento produttivo e qualitativo.

Risulta quindi fondamentale mettere in atto, oltre alle già citate pratiche agronomiche, un razionale controllo chimico che prenda in considerazione i seguenti aspetti:

- valutazione della presenza di nematodi nel terreno;
- esecuzione dei trattamenti secondo ben definite modalità.

In situazioni di verificata presenza di nematodi previo campionamento e analisi dei terreni; risulta necessario eseguire trattamenti al terreno utilizzando i principi attivi riportati nella tabella allegata. In particolare, le modalità per l'impiego dei fumiganti devono seguire i seguenti criteri:

- localizzare i trattamenti lungo la fila su una banda di 30-40 cm di larghezza alla formazione del colmo di terreno;
- successivamente procedere all'arieggiamento del colmo prima delle operazioni di trapianto.

Su un'apposita scheda è indispensabile annotare data, qualità e quantità degli agrofarmaci usati nella coltura.

L'elenco dei prodotti consigliati è riportato nelle tabelle allegate.

Raccolta

Per avere una buona qualità è fondamentale raccogliere foglie mature.

Non raccogliere alcuna foglia prima che sia trascorso l'intervallo di sicurezza (periodo di carenza) dei diversi agrofarmaci utilizzati per la difesa della coltura e per il controllo dei germogli.

Le foglie vanno raccolte al giusto grado di maturazione tecnica. I segni di tale maturazione iniziano dalle foglie più basse e procedono verso l'alto.

La raccolta dovrà essere fatta per corona fogliare, e non deve essere inferiore a 4 interventi come di seguito indicato:

- I^a bassa foglia /pre-mediana
- II^a prima mediana
- III^a seconda mediana
- IV^a apicale

Le prime foglie basali a diretto contatto con il terreno non dovranno essere raccolte.

La riuscita della cura dipende in buona parte dal giusto grado di maturazione delle foglie.

Con una raccolta troppo anticipata si hanno foglie molto ricche di clorofilla e difficili da far ingiallire, che curano male e prendono un colore verdastro.

Con una raccolta ritardata oltre a perdere parte della produzione, si ottiene un tabacco di colore giallo paglierino, poco elastico e di tessuto poco consistente.

Cura

Nel tabacco Virginia Bright la cura si effettua a flusso d'aria ("flue cured"), all'interno di appositi essiccatoi ("bulk-curing"), per mezzo di aria calda a ventilazione forzata.

Per questo motivo è importante che le foglie abbiano lo stesso stadio di maturazione e che la densità all'interno del contenitore o dei telaini sia uniforme.

A tale proposito si raccomanda di:

- programmare e verificare la cura in base alle caratteristiche del tabacco (stato di maturazione, tipologia di foglie raccolte, qualità del tessuto fogliare);
- iniziare lo smaltimento dell'umidità eccessiva fin dalle prime fasi di cura, mantenendo all'interno del "bulk curing" il giusto rapporto tra temperatura e umidità relativa dell'aria, ciò al fine di evitare colori indesiderati;
- evitare di produrre tabacco "arrossato" artificialmente, fenomeno dovuto ad innalzamenti troppo rapidi della temperatura in presenza di umidità relativa ancora elevata nell'ultima fase di cura;
- non raggiungere temperature eccessive (oltre 70 °C) a fine cura.

Il processo di cura deve essere articolato in quattro fasi successive: ingiallimento,

fissazione del colore, essiccazione della lamina fogliare e essiccazione della costola. È opportuno dotare il “bulk curing” di centraline di controllo e avanzamento automatico delle fasi di cura.

Esse infatti consentono di:

- programmare e adattare la cura secondo la tipologia del tabacco;
- ottimizzare la temperatura e l’umidità relativa nelle varie fasi di cura;
- migliorare la qualità del prodotto finito rispetto a quello ottenuto con la cura manuale;
- risparmiare energia.

La modalità della cura può esaltare o deprimere le caratteristiche estrinseche ed intrinseche nonché la conservabilità del prodotto.

Dove le strutture lo consentono è da privilegiare l’utilizzo di metano o GPL come fonte di energia perché permettono di ridurre l’inquinamento dell’ambiente ed abbassare i costi di essiccazione. È indispensabile che gli essiccatoi, indipendentemente dal gas utilizzato, abbiano gli scambiatori di calore.

Allestimento della partita

Al fine della migliore valorizzazione e conservazione del tabacco in attesa di lavorazione e per consentire allo stesso di beneficiare di una continua e graduale trasformazione biochimica che ne migliora la qualità, il tabacco in foglia deve essere condizionato in colli provvisori rispettando regole consolidate da lunga esperienza quali:

- il tabacco deve essere separato per corona fogliare allo scopo di avere colli omogenei;
- eliminazione di foglie verde-marcato, nere e sostanze estranee diffuse (germogli, parti di stelo, erbacce, foglie con muffa, terra, sassi, etc.), tale operazione è indispensabile ai fini del possibile inserimento del collo in una delle classi merceologiche. Un eccesso di tali materiali e la presenza di materiali di origine sintetica porterà a classificare il collo non commerciabile;
- l’umidità non deve superare quella consentita dai regolamenti U.E. per le diverse tipologie di tabacco, che per il Virginia Bright è del 16%; tuttavia, è preferibile rimanere al di sotto di queste percentuali per assicurare al prodotto una buona conservazione ed evitarne possibili alterazioni (placcature, muffe ed incremento di

- nitrosammine);
- la densità del tabacco all'interno del collo deve essere quanto più bassa e uniforme, onde evitare una elevata costipazione, in particolare nella parte inferiore del collo stesso, che può determinare un deterioramento della qualità e a seconda dell'umidità una frasmizzazione o la placcatura e/o muffa del prodotto;
 - il peso netto del collo di Virginia Bright deve oscillare da 90 a 110 kg circa;
 - i colli dovranno essere identificati con appositi cartellini per la tracciabilità del prodotto.

La fase di allestimento della partita di tabacco “in foglia” è fortemente condizionata dalla tecnica colturale ed in particolare da una attenta separazione delle foglie alla raccolta; questa fase quindi è l'insieme di quelle operazioni che, se condotte con diligenza e sulla base di chiare intese tra i coltivatori, le associazioni e i trasformatori, possono far conseguire economie di filiera e la migliore valorizzazione del prodotto. Infatti, con limitati costi aggiuntivi, si possono ottenere colli provvisori omogenei, privi di sostanze estranee e con il giusto grado di costipazione, che possono essere cerniti dal trasformatore con limitati costi e valorizzati ai massimi livelli.

Nel Virginia Bright, d'intesa con il trasformatore destinatario, può essere agevole eseguire a fine cura, nel momento dello svuotamento del “bulk curing”, una vera e propria pre-cernita su un tabacco che, essendo ancora leggermente umido e soffice, è nelle migliori condizioni di manipolazione.

Tracciabilità

Ogni singolo collo sarà dotato di un cartellino di identificazione che riporti oltre alla ragione sociale dell'Associazione ed al nome del Produttore, le informazioni necessarie per la tracciabilità del prodotto: linea varietale e tecnica colturale adottata dal Coltivatore.

Al momento della vendita del tabacco, queste informazioni saranno fornite all'Azienda di Trasformazione acquirente che provvederà a collegarle al futuro prodotto finito, su richiesta del Cliente finale.

Conservazione del tabacco curato

I locali per la conservazione del prodotto in colli devono essere esclusivamente adibiti al tabacco (almeno nel periodo di permanenza di questo). Ove questo non sia possibile per problemi di logistica aziendale, devono necessariamente essere definite aree specifiche destinate solo al tabacco, separate con barriere fisiche dagli altri spazi e materiali. Come barriere possono essere utilizzati pannelli di legno, mattoni o altri materiali durevoli; film plastici di polietilene possono essere considerati una soluzione a breve termine purché in perfetto stato di conservazione.

La conservazione del tabacco deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:

- il tabacco va posto su pedane o tavole di legno;
- i locali di conservazione devono essere asciutti e ben arieggiati;
- deve essere garantita l'igiene e l'assenza di qualsiasi potenziale fonte di contaminazione del tabacco sia di origine organica (animale o vegetale) che inorganica;
- nel locale non devono esservi sostanze che possono cedere odore al tabacco (nafta, vernici, antiparassitari etc.).

Riduzione delle nitrosammine

La formazione delle nitrosammine è legata a fenomeni di natura chimica e biologica che avvengono a partire dalla fase di raccolta delle foglie, con la conseguente morte cellulare, fino al momento in cui il tabacco viene confezionato in sigaretta o altro prodotto finito.

La pianta del tabacco non contiene nitrosammine ma gli alcaloidi suoi precursori: nicotina, nornicotina, anabasina e anatabina.

Il livello finale di nitrosammine nel tabacco può dipendere dai seguenti fattori:

- la varietà e la tecnica colturale che influenzano il contenuto iniziale di alcaloidi e nitrati nelle foglie;
- le condizioni di cura in cui avviene il processo di nitrosazione degli alcaloidi;
- le condizioni di conservazione del tabacco curato, prima e dopo l'allestimento

in colli, che possono incrementare il processo di nitrosazione degli alcaloidi.

Nei programmi per la riduzione delle nitrosammine si dovranno perciò tenere in considerazione i seguenti aspetti:

Concimazioni azotate

Un'alta disponibilità di azoto per la pianta può contribuire ad elevare i contenuti di composti azotati nelle foglie e di conseguenza il contenuto di nitrosammine.

Si dovrà prestare la massima attenzione alle giuste dosi e forma di azoto da apportare alla coltura.

Cura

Nel Virginia Bright il fattore principale che causa la presenza di nitrosammine si individua nella cura condotta con forni a “vena d’aria” che causa una importante fonte di agenti nitrosanti indipendenti dall’attività microbica. In questo tipo di cura le foglie di tabacco sono direttamente esposte ai gas di combustione e agli ossidi di azoto in essi contenuti che reagendo con gli alcaloidi presenti nel tabacco contribuiscono ad aumentare il contenuto di nitrosammine. Si dovranno adottare i sistemi di cura dotati di scambiatori di calore che evitino al tabacco l’esposizione ai gas di combustione e ai loro sottoprodotti.

Umidità di conservazione del tabacco dopo l’imballaggio

Per la riduzione delle nitrosammine è di fondamentale importanza la corretta conservazione del tabacco curato. Prima e dopo l’imballaggio livelli di umidità superiori a quelli massimi riportati precedentemente e con temperature favorevoli all’avvio dell’attività microbica, possono portare ad un innalzamento del contenuto di nitrosammine.

Le foglie all’interno dei colli dovranno avere una densità uniforme e mai eccessiva. Inoltre, dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare qualsiasi fenomeno di innalzamento della temperatura all’interno dei colli allestiti.

Eliminazione delle sostanze estranee

Per l'ottenimento di un prodotto di alta qualità ed integro è indispensabile porre sempre maggiore attenzione alle sostanze estranee che possono essere presenti nel tabacco. Le maggiori probabilità che queste entrino a contatto con il tabacco si verificano nelle diverse fasi del processo produttivo.

Occorre, quindi, mettere in atto azioni volte ad eliminare questo inconveniente.

Alcuni esempi di sostanze estranee possono essere:

- spaghi e legacci;
- aghi e pezzi metallici di cestoni o telaini;
- germogli e parti di fusto del tabacco;
- erbe infestanti;
- terra e sassi;
- componenti delle macchine raccogliatrici: gomma, metallo, olio idraulico;
- frammenti di vestiario degli operatori, guanti, oggetti personali vari;
- confezioni di cibo, sigarette, bottiglie e bicchieri di plastica.

Inoltre, dai *bulk curing* e dal confezionamento in scatole possono derivare:

- poliuretano e altro isolante;
- parti di vernice, fibra di vetro;
- gomme e spugna;
- frammenti di film plastici, di cartoni, legno, metallo, cemento;
- vapori del combustibile per la cura;
- olio idraulico delle presse;
- targhette di identificazione, colla, spaghi, reggette, etc.;
- insetti, piccoli animali, parti di pelle, pelo e setole di animali.

Per ovviare a questi inconvenienti è indispensabile:

- prevenire l'introduzione di sostanze estranee durante il processo produttivo;
- individuare e rimuovere le sostanze estranee eventualmente trovate nel tabacco;
- proteggere il prodotto confezionato in colli;

- aumentare la consapevolezza degli operatori riguardo le sostanze estranee;
- usare macchinari, strumenti e strutture che impediscano la presenza di sostanze estranee nel tabacco;
- eseguire un'appropriata manipolazione del tabacco;

Le più importanti disposizioni da adottare per evitare la presenza di sostanze estranee nel tabacco confezionato in colli sono:

- identificare e registrare insieme ai Tecnici delle Associazioni i potenziali rischi di contaminazione presenti nell'Azienda;
- eseguire appropriate tecniche colturali, in particolare nel controllo delle erbe infestanti, nella cimatura e nel controllo dei germogli;
- prima dell'utilizzo dei macchinari e delle strutture eseguire una pulizia e manutenzione degli stessi;
- istruire gli operatori per evitare contaminazione da parte di indumenti e oggetti personali:
 - usare abbigliamento adeguato senza tasche aperte o pendenti per evitare possibili lacerazioni;
 - evitare di portare oggetti personali che possano cadere nel tabacco;
 - controllare regolarmente a fine turno di lavoro di non aver smarrito guanti, cappellini, etc.;
 - non appoggiare nessun oggetto sopra al tabacco in fase di manipolazione;
- non permettere di mangiare, bere e fumare vicino al tabacco;
- evitare di mettere direttamente nel collo in allestimento il tabacco raccolto da terra senza prima averlo cernito accuratamente;
- tenere puliti durante la giornata lavorativa i luoghi di lavoro durante le varie operazioni;
- avere contenitori con scritto evidente “sostanze estranee”;
- cartellinare i colli per la tracciabilità del prodotto e quindi poter disporre azioni correttive su una partita;
- assicurare l'igiene e la pulizia dei magazzini;
- evitare ogni potenziale contaminazione durante il trasporto ai magazzini di vendita.

Assistenza tecnica

Sarà prestata da personale specializzato delle Associazioni di Produttori.

Il tecnico seguirà il produttore dalla fase di programmazione della campagna tabacchicola fino al conferimento del prodotto.

In particolare, dovrà consigliare e verificare:

- la varietà più idonea da coltivare;
- gli interventi tecnici da adottare per ottenere una piantina di buona qualità;
- la concimazione del suolo;
- le lavorazioni ritenute più idonee alle caratteristiche fisiche del terreno;
- l'effettiva necessità di intervenire, dopo il trapianto, con erbicidi;
- gli eventuali trattamenti fungicidi in funzione anche all'andamento climatico registrato nelle indispensabili stazioni meteorologiche;
- la popolazione di insetti parassiti e di quelli utili con l'ausilio di opportuni strumenti (trappole a feromoni, etc.);
- la soglia del danno, consigliando il tipo di prodotto, i tempi e la modalità di distribuzione;
- le norme relative alla sicurezza durante la distribuzione dei fitofarmaci ed il corretto smaltimento delle confezioni;
- le norme relative allo stoccaggio dei fitofarmaci;
- i tempi di carenza degli agrofarmaci per evitare residui nel tabacco secco;
- le eventuali correzioni al piano di concimazione legate all'andamento stagionale ed allo sviluppo vegetativo della coltivazione;
- i tempi e i volumi di adacquamento mediante il controllo dell'evapotraspirazione e lo sviluppo delle piante;
- il momento ottimale delle operazioni di cimatura;
- i tempi di raccolta in funzione del grado di maturazione;
- il programma di cura idoneo alle caratteristiche del tabacco raccolto;
- le modalità di cernita ed allestimento del prodotto;
- l'applicazione dei programmi per evitare la presenza delle sostanze estranee;
- la qualità del prodotto del singolo coltivatore durante il conferimento, al fine di individuare, in tempo reale, eventuali difetti e, per il futuro, operare quelle scelte tecniche indispensabili alla loro correzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CEE) 2075/92

Regolamento (CE) n° 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, come integrato e modificato dal Regolamento (CE) n° 1679/2005 del Consiglio del 6 ottobre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento (CE) 1782/2003

Regolamento (CE) n° 1782/2003 del Consiglio, del 30 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 e (CE) n° 2529/2001 e successive modifiche.

Regolamento (CE) 864/2004

Regolamento (CE) n° 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il Regolamento (CE) n° 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento (CE) 795/2004

Regolamento (CE) n° 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al Regolamento (CE) n° 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come integrato e modificato dal regolamento (CE) n° 2183/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed

integrazioni.

Regolamento (CE) 796/2004

Regolamento (CE) n° 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n° 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come integrato e modificato dal regolamento (CE) n° 2184/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento (CE) 1973/2004

Regolamento (CE) n° 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n° 1782/2003 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, come integrato e modificato dal regolamento (CE) n° 2182/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

D.Lgs. 27 maggio 2005, n° 102

Decreto Legislativo n° 102, del 27 maggio 2005, recante norme sulla regolazione dei mercati agroalimentari e successive modifiche ed integrazioni.

D.M. 29 luglio 2005, n° 790/G-1

Decreto Ministeriale n° 790/G-1, del 29 luglio 2005, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco per quanto riguarda il premio disaccoppiato e la fissazione dei tassi di disaccoppiamento in Italia.

D.M. 30 gennaio 2006, n° D/63

Decreto Ministeriale n° D/63, del 30 gennaio 2006, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco per quanto riguarda l'aiuto accoppiato in Italia.

Circolare AGEA ACIU 187 - 2006

Circolare AGEA ACIU 187 – 2006, del 21 febbraio 2006, applicativa del Decreto Ministeriale n° D/63, sulle disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco per quanto riguarda l’aiuto accoppiato in Italia.

Circolare AGEA N30

Circolare AGEA N30 del 9 ottobre 2006 recante disposizioni relative alle procedure operative per il controllo ai sensi dei reg. 1973/04 e 2182/05 e 2184/05 recepiti mediante il DM d/63 del 30 gennaio 2006.

Legge 25 novembre 1971, n° 1096

e successivi atti di modifica e di integrazione, relativa alla disciplina dell’attività sementiera.

D.M. del 14/10/2002, D.M. del 14/10/2003, D.M. del 7/3/2005, D.M. del 30/09/2005, D.M. del 02/01/2006

relativi all’iscrizione di varietà di tabacco al Registro Nazionale delle Varietà Vegetali.

D.P.R. n° 290 del 23/04/2001

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

D.M. 27 agosto 2004

e successive modificazioni, sui limiti massimi per residui di sostanze attive di fitosanitari in prodotti destinati all’alimentazione, tabacco compreso.

D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modifiche ed integrazioni.

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi e successive modifiche ed integrazioni.

Accordo Interprofessionale OIT 2018 – 2020 che regola la filiera del tabacco in Italia, inclusi i controlli sulla consistenza delle coltivazioni e sulle consegne.

Piano Fitosanitario OI Tabacco Italia 2018-2020 che recepisce la normativa in materia fitosanitaria ed indica gli agrofarmaci utilizzabili per il controllo delle avversità parassitarie.

Tab. 1 – Tabella delle caratteristiche varietali

S=sensibile; R=resistente; T=tollerante

PP=molto precoce; P=precoce; MP=medio-precoce; M=medio; MT=medio-tardivo; T=tardivo

Varietà	Tipo terreno	Ciclo culturale	Concimazione azotata	Resistenza a virusi	Resistenza Nematodi	Resistenza allestamento	Resistenza marciume	Raccolta meccanica per corona	Area di produzione consigliata
ITB 6118	Medio impasto	PP	Medio alta	PVY	S	Discreta	R	Buona	Centro Italia
ITB 678	Tutti i tipi	P	Medio alta	PVY	S	Bassa	R	Buona	Centro Italia
ITB 6178	Tutti i tipi	MP	Medio alta	PVY	S	Medio Bassa	R	Buona	Centro Italia
PVH 2310	Sabbioso	M	Media	PVY - TMV	T	Ottima	S	Ottima	Centro e Nord Italia
PVH 2324	Medio impasto	M	Media	PVY - TMV	T	Ottima	R	Ottima	Centro e Nord Italia
PVH 2233	Sabbioso	MT	Media	PVY - TMV	T	Ottima	S	Ottima	Centro e Nord Italia
PVH 2261	Sabbioso	MT	Media	PVY - TMV	T	Ottima	S	Ottima	Centro e Nord Italia
AGR 92	Medio impasto sabbioso	M	Medio alta	PVY	S	Buona	S	Ottima	Centro Italia
K 326 PVY	Sabbioso	T	Media	PVY	S	Ottima	S	Ottima	Nord Italia
NC 100	Sabbioso	MT	Media	PVY - TMV	T	Ottima	S	Ottima	Nord Italia

VIRGINIA BRIGHT - FASI COLTIVAZIONE																																	
ATTIVITA'	Mese	Marzo				Aprile				Maggio				Giugno				Luglio				Agosto				Settembre				Ottobre			
	Settimana	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Produzione piantine	CENTRO																																
	NORD																																
Lavorazione terreno	CENTRO																																
	NORD																																
Trapianto	CENTRO																																
	NORD																																
Concimazione	CENTRO																																
	NORD																																
Trattamenti	CENTRO																																
	NORD																																
Cimatura	CENTRO																																
	NORD																																
Raccolta	CENTRO																																
	NORD																																
Cura	CENTRO																																
	NORD																																
Irrigazione	CENTRO																																
	NORD																																

TAB. 2 VIRGINIA BRIGHT- CONTROLLO MALATTIE CRITTOGAMICHE

Principio attivo	Classe tossicologica (*)	Prodotto commerciale più diffuso	Dose (Kg/ha)	Crittogame controllate	Note	Tempo di carenza (giorni)	Tempo di rientro (giorni)	Indice di utilizzo Bright (*)	Avvertenze d'uso (*)	Scadenza autorizzazione
Metalaxyl + Mancozeb	B, C, F	CEREXIL M DG (8g+64g)	1,5-2,5	Peronospora	3 trattamenti intercalati di 12-14 gg a partire dalla ripresa vegetativa post trapianto	28	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	****	Attenzione	30/06/2023
Propamocarb + Fosetyl Al	C	PREVICUR ENERGY (47,3g+27,7g)	6 ml/m3 (in serra)	Phytium	In serra: 6 ml/m3 alla semina o 3 ml/m3 in 2 interventi: il primo alla semina il secondo dopo circa 2 settimane	Non indicato in etichetta	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	****	Attenzione	31/07/2019
Zoxamide + Cimoxanil	C, F	LIETO SC (3,2g+2,5g)	4-4,5	Peronospora	Intervento preventivo ad intervalli di 7-10 giorni	14	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	**	Attenzione	31/06/2034
Acibenzolar-S-Methyl + Metalaxyl M	F	BION MX (4g+40g)	0,25-0,3	Peronospora	3 trattamenti intercalati di 7-10 gg a partire dalla ripresa vegetativa post trapianto. I trattamenti devono essere preventivi	7	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	**	Attenzione	31/03/2031
Cimoxanil	C	VITENE ULTRA SC (21,56g)	0,5-0,6	Peronospora	Citotropico/curativo	10	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	**	Attenzione	31/08/2021
Fenamidone + Fosetyl Al	C, F	ELICIO (4,4g+66,7g)	2,5-3	Peronospora	Interventi intercalati ogni 8-10 gg	30	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	**	Attenzione	31/07/2019
Ciprodinil + Fludioxonil	C, F	SWITCH (37,5g +25g)	0,6	Alternaria	2 trattamenti dalla cimatura	Non indicato in etichetta	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	**	Attenzione	31/10/2019
Cyazofamide	C, F	RANMAN TOP (14,8g)	0,5	Peronospora	Trattamento ogni 7-10 gg	Non indicato in etichetta per il tabacco	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	31/07/2018
Penconazolo	C, F	TOPAS 10 EC (10,1g)	0,35-0,5	Oidio	2-3 trattamenti preventivi o a partire dalla comparsa dei primi sintomi, ad intervalli di 10-14 gg	14	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	31/12/2021
Rame metallo (solfato tribasico)	F	IDRORAME FLOW (15,2g)	1,5-2,5 (ogni trattamento)	Peronospora e batteriosi	Anticrittogamico rameico caratterizzato da adesività e persistenza. Ripetere i trattamenti fino ad un massimo di 4. La dose maggiore in stagioni particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno	20	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	31/12/2025
Cimoxanil	B, C, F	CYMONE 25 WP (25g)	0,8-1	Peronospora	Citotropico/curativo	10	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	31/08/2021

(*) **Classe tossicologica**: vedi riferimenti scheda pittogrammi - **Indice utilizzo prodotti**: * raro; ** sporadico; *** normale; **** frequente - **Avvertenze d'uso**: Pericolo, Attenzione, nessuna - **Nome prodotto verde** = Utilizzabile in agricoltura

TAB. 3 VIRGINIA BRIGHT- CONTROLLO INSETTI

Principio attivo	Classe tossicologica (*)	Prodotto commerciale più diffuso	Dose (Kg/ha)	Insetti controllati	Note	Tempo di carenza (giorni)	Tempo di rientro (giorni)	Indice di utilizzo Bright (*)	Avvertenze d'uso (*)	Scadenza autorizzazione
Deltametrina	F	METEOR (1,51g)	0,6-0,8	Nottue e pulce	Effettuare trattamento post trapianto in caso di presenza di piante attaccate	3	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	****	Attenzione	31/10/2019
Indoxacarb	B, C, F	STEWARD (30g)	0,125	Nottue	Solo se in deroga. Iniziare i trattamenti dalla schiusura delle uova o quando sono visibili le prime erosioni delle larve neonate, effettuando gli eventuali successivi trattamenti a intervallo di 8-10 gg, max 2 applicazioni/anno	3	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*** nord Italia * centro Italia	Attenzione	31/10/2019
Deltametrina + Imidacloprid	F	DECIS ENERGY O-TEQ (7,65g+1,02g)	1-1,25	Nottue, pulce e afidi	Effettuare trattamento post trapianto in caso di presenza di piante attaccate	14	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	**	Attenzione	31/07/2022
Deltametrina	F	DECIS EVO (2,42g)	0,5-0,8	Nottue e pulce	Effettuare trattamento post trapianto in caso di presenza di piante attaccate	3	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	**	Attenzione	31/10/2019
Acetamiprid	F	EPIK SL (4,67g)	2	Pulce e afidi	Previsti max 2 trattamenti/anno	14	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	28/04/2034
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki	C	ABLE (6,4g)	1-1,5 (ogni trattamento)	Nottue	Intervenire quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, in ogni caso, ai primi stadi larvali (I e II). Dallo stadio di 2 foglie vere si può intervenire alla comparsa delle prime larve e ripetere il trattamento ogni 7 gg se necessario, fino a max 6 applicazioni consecutive		Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	30/04/2019
Bacillus thuringiensis subsp. Azawai	C	FLORBAC (10g)	0,6-1,5 (ogni trattamento)	Nottue	Il prodotto va impiegato appena compaiono le larve. È consigliabile ripetere il trattamento una seconda volta a distanza di 7-14 gg in relazione al grado di infestazione da combattere	3	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	30/04/2019
Estratto di piretro	D, F	ASSET (4g)	1 (ogni trattamento)	Pulce e afidi	Prima della comparsa dei parassiti, eventualmente ripetere il trattamento dopo 7-8 gg contro le generazioni successive	2	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Pericolo	31/08/2022
Teflutrin	F	FORCE (0,5g)	12-15	Insetti terricoli	Prima del trapianto localizzato sulla fila	Non indicato in etichetta	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	31/12/2021
Thiamethoxam	F	ACTARA 25 WG (25g)	0,2	Pulce e afidi	Previsti max 2 trattamenti/anno	14	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	30/04/2019
Imidacloprid	F	CONFIDOR 200 SL (17,1g)	0,5	Pulce e afidi	Previsto 1 solo trattamento/anno	14	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	31/07/2022
Flupyradifurone	F	SIVANTO PRIME (17,1 g)	0,5	Afidi	Previsto 1 solo trattamento/anno	3	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	09/12/2026
Zeta-Cipermetrina	F	TRIKA ZETA (0,8g)	12-15	Insetti terricoli	Prima del trapianto localizzato sulla fila	7	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	30/11/2021

(*) **Classe tossicologica:** vedi riferimenti scheda pittogrammi - **Indice utilizzo prodotti:** * raro; ** sporadico; *** normale; **** frequente - **Avvertenze d'uso:** Pericolo, Attenzione, nessuna - **Nome prodotto verde** = Utilizzabile in agricoltura biologica

TAB. 4 VIRGINIA BRIGHT - CONTROLLO NEMATODI

Principio attivo	Classe tossicologica (*)	Prodotto commerciale più diffuso	Dose (Kg/ha)	Parassiti controllati	Note	Tempo di carenza (giorni)	Tempo di rientro (giorni)	Indice di utilizzo Bright (*)	Avvertenze d'uso (*)	Scadenza autorizzazione
1,3 Dicloropropene	A	GEOCLEAN NEMA (92,5g)	140	Nematodi	Uso consentito in pieno campo su terreno in assenza di coltura, destinato alla semina e o trapianto di tabacco. Per prevenire eventuali perdite del prodotto e assicurarsi che una efficace concentrazione rimanga nel terreno per un periodo più prolungato, il prodotto va applicato con macchina fumigatrice. Si suggerisce la copertura del terreno con telo pacciamante non forato, debitamente fissato al suolo per evitare il rigonfiamento dovuto alle correnti d'aria e la conseguente perdita di prodotto. Il telo va rimosso prima sollevando i margini interrati e solo dopo 12-24 ore l'intero telo di plastica	14/21 giorni per l'eliminazione del telo; almeno 31 giorni prima del trapianto	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	**** nord Italia * centro Italia	Pericolo	Per il 2019 è stato autorizzazione in deroga fino al 01/07/2019
Etoprofos	A	MOCAP10 G (10g)	50	Nematodi e insetti terricoli (elateridi)	Contatticida senza azione fumigante o sistemica, 25 Kg localizzati 3-5 giorni post trapianto, 25 Kg localizzati alla prima sarchiatura, far seguire le distribuzioni da un'irrigazione	30	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Pericolo	31/07/2019
Fluopyram	F	VELUM PRIME (34,5g)	0,375-0,625 in manichetta	Nematodi e oidio	Pre trapianto con incorporamento da ripetere con irrigazione a goccia in post trapianto, previsti non più di due trattamenti/anno, non per il solo controllo degli agenti di oidio	Non indicato in etichetta	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	31/01/2025
Oxamil	A	VYDATE 5G (5g)	60-70	Nematodi e insetti	30-35 Kg localizzati alla prima sarchiatura + 30-35 Kg al secondo intervento di sarchiatura	Non indicato in etichetta	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Pericolo	31/01/2020

(*) **Classe tossicologica**: vedi riferimenti scheda pittogrammi - **Indice utilizzo prodotti**: * raro; ** sporadico; *** normale; **** frequente - **Avvertenze d'uso**: Pericolo, Attenzione, nessuna

TAB. 5 VIRGINIA BRIGHT - DISERBO

Principio attivo	Classe tossicologica (*)	Prodotto commerciale più diffuso	Dose (Kg/ha)	Infestanti controllate	Note	Tempo di carenza (giorni)	Tempo di rientro (giorni)	Indice di utilizzo Bright (*)	Avvertenze d'uso (*)	Scadenza autorizzazione
Clomazone	Non classificato	COMMAND 36 CS (30,74%)	0,5	Dicotiledoni e graminacee	Post trapianto localizzato in banda da 50 cm su terreno umido	Non indicato in etichetta per il tabacco	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	****	nessuna	31/10/2019
Pendimetalin	C, F	STOMP AQUA (38,9g)	1-2,5	Dicotiledoni e graminacee	Solo in pre trapianto senza interramento	Non indicato in etichetta per il tabacco	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	****	Attenzione	31/08/2024
Aclonifen	B, F	CHALLENGE (49,6g)	2,5-3	Dicotiledoni	Pre trapianto	Non indicato in etichetta	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	***	Attenzione	31/07/2022
Oxadiazon	F	RONSTAR FL (34,86g)	0,7	Dicotiledoni e graminacee	Solo in pre trapianto	Non indicato in etichetta	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	**	Attenzione	30/06/2020
Pendimetalin + Clomazone	C, F	BISMARK (24,56g+4,90g)	2,5-3	Dicotiledoni e graminacee	Pre trapianto	Non indicato in etichetta	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	**	Attenzione	31/08/2024
Napropamide	C, F	DEVRIOL F (41,85g)	2,2-4	Dicotiledoni e graminacee	Solo in pre trapianto	Non indicato in etichetta	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	31/12/2020
Quizalofop-etile	C, F	TARGA FLO (4,90g)	1-1,5	Graminacee	Graminicida post trapianto (dose in funzione di tipo e sviluppo infestante) - funziona solo su graminacee nate	30	Se non indicato in etichetta, dopo 2 gg	*	Attenzione	30/11/2021

(*) **Classe tossicologica:** vedi riferimenti scheda pittogrammi - **Indice utilizzo prodotti:** * raro; ** sporadico; *** normale; **** frequente - **Avvertenze d'uso:** Pericolo, Attenzione, nessuna

TAB. 6 VIRGINIA BRIGHT - CONTROLLO GERMOGLI

Principio attivo	Classe tossicologica (*)	Prodotto commerciale più diffuso	Dose (Kg/ha)	Note	Tempo di carenza (giorni)	Tempo di rientro (giorni)	Indice di utilizzo (*)	Avvertenze d'uso (*)	Scadenza autorizzazione
N-Decanolo	C, F	DE-SPROUT (79g)	40 l/ha	Intervenire alla prima emissione dei bottoni fiorali concentrazione 3%; cimare; ripetere un secondo passaggio con alcool grasso al 2,5/3,0% dopo 5-7 giorni.	7	Se non indicato dopo 2 giorni	****	Attenzione	31/05/2021
Idrazide Maleica	C	ROYAL MH (16,6 g)	11-15 l/ha	Intervenire come ultimo passaggio (ove necessario) con Idrazide maleica a 14 giorni dalla cimatura – evitare la distribuzione nelle ore più calde della giornata	10	Se non indicato dopo 2 giorni	****	Attenzione	31/10/2032
Pendimetalin	C	ACTIVUS 40 SC (40 G)	20 ml/pianta di una soluzione allo 0,01%	Applicare alla somità dello stelo. Non spruzzare o nebulizzare il prodotto sulle piante. Il prodotto non deve entrare in contatto con le foglie.	Non indicato in etichetta per tabacco	Se non indicato dopo 2 giorni	**	Attenzione	31/08/2024

(*) **Classe tossicologica:** vedi riferimenti scheda pittogrammi - **Indice utilizzo prodotti:** * raro; ** sporadico; *** normale; **** frequente - **Avvertenze d'uso:** Pericolo, Attenzione, nessuna

